

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА



для защиты от туберкулеза в России используются вакцины БЦЖ и БЦЖ-М



БЦЖ

- “классическая”
- одна доза содержит 0,05 мг микробных клеток
- для вакцинации и ревакцинации



БЦЖ-М

- более “легкая”
- одна доза содержит 0,025 мг микробных клеток
- для вакцинации

Показания к применению: профилактика туберкулеза у детей



для территорий с показателями заболеваемости туберкулезом выше 80 на 100 тысяч населения



при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом



для территорий с показателями заболеваемости туберкулезом менее 80 на 100 тысяч населения



Схема вакцинации:

V – новорожденным на 3-7 день жизни

RV – в 6-7 лет (при отрицательном результате пробы Манту)



ТУБЕРКУЛЁЗ



Туберкулёз – инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулёза

Симптомы:

- лихорадка и озноб, ночная потливость
- потеря аппетита, снижение веса
- усталость, быстрая утомляемость
- длительный кашель (более 3 недель)
- боль в груди, связанная с дыханием
- кровохарканье

Часто туберкулёз протекает бессимптомно и выявляется случайно!



Пути передачи



- воздушно-капельный,
- реже – воздушно-пылевой, контактный, алиментарный, вертикальный



Источник инфекции

больные лёгочной формой туберкулеза с наличием бактериовыделения

Профилактика туберкулеза



Вакцинация детей против туберкулеза

V – на 3-7 день жизни ребенка,
RV – в 6-7 лет*

*при отрицательной пробе Манту



Регулярные медицинские обследования

- Дети – туберкулинодиагностика
- Подростки – туберкулинодиагностика и флюорографическое обследование
- Взрослые – флюорографическое обследование



Здоровый образ жизни

- Полноценное питание
- Полноценный сон и отдых
- Физическая активность
- Отказ от вредных привычек

